

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
PERFORMANS 16-5-30

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>% W/W</u>
Toplam Azot (N):	16
Amonyum Azotu(NH4-N)	1
Üre Azotu (NH2-N)	15
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)	5
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O)	30

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU :

<u>Bitki Çeşidi</u>	<u>Kullanma Dönemi</u>	<u>Kullanım Dozu</u>
Sera Bitkileri	Meyve oluşumu başlangıcından hasat sonuna kadar 3-4 günde	2-3 kg/dekar(1000m2) 250 gr/100lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Meyve Ağaçları	Çiçeklenmeden itibaren hasat boyunca	6-7 kg /dekar (1000m2) 400 gr/100 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Bağ	Meyve oluşum başlangıcından hasat sonuna kadar	6-7 kg /dekar (1000m2) 300 gr/100 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Zeytin	Çiçeklenmeden itibaren hasat sonuna kadar	6-8 kg/dekar(1000m2) 300 gr/100 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Açık Alan Bitkileri (Sebze)	Çiçeklenmeden itibaren hasat sonuna kadar	2-3 kg/dekar(1000m2) 300 gr/100 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Ayçiçeği-Tütün Mısır-Pamuk	Bitkiler 6-7 yaprak olunca	4-5 kg/dekar(1000m2) 300gr/100 lt su ile yapraktan3-4kg/da kökten
Hububat	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde	7-8 kg/dekar(1000m2) 400 gr/100 lt su ile yapraktan
Baklagiller	İkinci çapadan sonra hasat sonuna kadar	4 kg/dekar(1000m2) 300 gr/100 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten

Lisans No:1484
Tescil No:24331