

EC FERTİLİZER  
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ  
PERFORMANS 18-9-26+ME

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>% W/W</u>
Toplam Azot (N):	18
Nitrat Azotu(NO3-N):	7,3
Amonyum Azotu(NH4-N)	5
Üre Azotu (NH2-N)	5,7
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)	9
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O)	26
Suda Çözünür Demir(Fe)EDTA ile Şelatlı	0,02
Suda Çözünür Mangan(Mn)EDTA ile Şelatlı	0,01
Suda Çözünür Çinko(Zn)EDTA ile Şelatlı	0,002
EDTA Şelatın Stabil olduğu Ph Aralığı Demir(Fe),Mangan(Mn),Çinko(Zn)	3-6

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU :

<u>Bitki Çeşidi</u>	<u>Kullanma Dönemi</u>	<u>Kullanım Dozu</u>
Domates,Biber,Patlıcan,Salatalık	Meyve oluşum döneminden başlayarak hasat sonuna kadar haftada 1-2 uygulama	200-300 gr/100 lt su ile yapraktan 2-3 kg/da kökten
Kavun-Karpuz	İlk meyve tutumundan sonra 10 gün ara ile hasata kadar	300-350 gr/100 lt su ile yapraktan 3 kg/da kökten
Fasulye,Bezelye	Ekimden 2 hafta sonra 10 gün ara ile 3-4 defa uygulanır	200-300 gr/da yapraktan 2-3 kg/da sulama suyuyla
Lahana,Karnabahar	Dikimden 4-6 hafta sonra 7-10 gün ara ile 3-4 defa uygulanır	200-300 gr/da yapraktan 2-3 kg/da sulama suyuyla
Şeker Pancarı,Havuç,Soğan	Bitki yaprakları 7-8 adet olunca 15 gün ara ile 2- 3 defa uygulanır	250-300gr/da yapraktan 2-3kg/da sulama suyuyla
Çilek	Çiçeklenme başlangıcı ve meyve dönemi olmak üzere haftada 1-2 defa uygulanır	200-250 gr/100 lt su ile yapraktan 2-3 kg/da kökten
Patates	Tomurcuk ve çiçek aşamasında 2 defa uygulanır	200-300 gr/da 100 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Narenciye	Çiçeklenme Döneminden önce başlayarak hasat sonuna kadar 3 kez uygulanır	200-300 cc/100 lt s ile 3-4 kg/da kökten
Bağ	Meyve oluşum dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 1-2 uygulama	200-250gr/100 lt su ile 3-4 kg/da kökten
Şeftali,Kayısı,Elma,Kiraz Erik,Armut	İlkbahar döneminden başlayarak hasat dönemine kadar 2-3 defa uygulanır	200-250 gr/100 lt su ile 2-4 kg/da kökten
Buğday,yulaf,Arpa,Çavdar,Çeltik	Kardeşlenme Döneminde yabana ot ilacı ile birlikte ve başaklanma başlangıcında 2 defa uygulanır	200-300 gr/da 1100 lt su ile yapraktan
Pamuk	Tarak yaprağı oluşumunda, Çiçek açma aşamasında ve meyve oluşurken uygulanır	200-250 gr/da 100 lt su ile 3-4 kg/da kökten
Ayçiçeği,Mısır	Bitkiler 6-7 yaprak olunca	200-250 gr/da 100 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Mercimek,Nohut	Çiçeklenmeden sonra iki defa uygulanır	200-300 gr/da 00 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Antep Fıstığı	Çiçek döktükten 20-25 gün sonra meyve bağlama döneminden önce olmak üzere 3-4 defa uygulanır	200-300 gr/100 lt su ile yapraktan 2-3 kg/da kökten
Fındık	İlk uygulama meyve tutumu döneminde, daha sonraki uygulamalar 20 gün ara ile 2-3 defa uygulanır	200-250 gr/da 100 lt su ile yapraktan 2-3 kg/da kökten
Zeytin	Çiçeklenmeden sonra -2 uygulama yapılır	200-300 gr/100 lt su ile 3-4 kg/da kökten
Tütün	Fide tarlaya alındıktan 30 gün sonra 1-2 kez uygulama yapılır	200-300 gr/da 100 lt su ile yapraktan 3-4 kg/da kökten
Süs Bitkileri	Yeterli yaprak düzeyi oluştuğunda 20-30 gün aralıklarla uygulama yapılır	200-300 gr/100 lt su ile yapraktan -2 kg/da kökten

Lisans No:1484  
Tescil No:24323